

Concentrado para emulsão (EC) com 5 g/L ou 0,5% (p/p) de ácido giberélico e 10 g/L ou 1% (p/p) de MCPA-tioetilo

Regulador de crescimento das plantas

CARACTERÍSTICAS

O FENGIB Plus é um regulador de crescimento indicado para aplicação em citrinos e pereiras, para melhorar o vingamento, o calibre e a distribuição dos frutos na árvore. Na cultura do morangueiro melhora o vingamento dos frutos, a precocidade da colheita e a uniformidade e calibre dos frutos.

MODO DE ACÇÃO

As características do modo de acção do Fengib Plus permitem:

Estimular a partenocarpia, originando elevadas taxas de vingamento.

- Incrementar a fotossíntese, que se traduz num aumento de hidratos de carbono disponíveis ao nível das flores.
- Favorecer a actividade enzimática, necessária ao metabolismo do fósforo e do azoto, fundamental na altura do vingamento dos frutos.
- Aumentar a divisão e a expansão celulares, dando origem a frutos de maiores dimensões e maior uniformidade de calibre.

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Culturas	Época de aplicação	Concentrações (mL/hL)	Volume de Calda (L/ha)
PEREIRA			
Rocha e Conference	30% das flores abertas.	100-125	800
Passé Crassane	70% das flores abertas.	75	800
CITRINOS			
Variedades de umbigo (Navel)	30% a 100% das pétalas caídas.	100	2000 - 3000
Valencia	100% das pétalas caídas até frutos com 20 mm de diâmetro.	100	2000 - 3000
Clementinas e tangerinas	50% a 70% de pétalas caídas, repetir 15 a 25 dias mais tarde.	50 + 50	2000 - 3000
MORANGUEIRO			
Morangueiro	1ª aplicação: ao aparecimento das primeiras flores, na fase de botão verde. 2ª aplicação: cerca de 15 dias depois, ao aparecimento dos primeiros frutos vingados. 3ª aplicação: cerca de 15 dias depois, tendo as plantas flores e frutos em desenvolvimento.	40 - 60	Até 700
Se se utilizarem volumes inferiores de calda dever-se-á aumentar a concentração da calda de modo a que se mantenha a quantidade de Fengib Plus distribuída por hectare.			

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Fengib Plus deve ser aplicado apenas em culturas em boas condições de desenvolvimento vegetativo.
- Em pomares onde foi aplicado Fengib Plus, poderá haver necessidade das árvores serem compensadas por fertilizações adequadas.
- Alguns sintomas como o enrolamento e embarquilhamento das folhas, podem ocorrer após a aplicação de Fengib Plus, podendo não ter significado em termos de quebra de produção. Temperaturas baixas e humidade prolongada podem contribuir para a persistência desses efeitos.
- Não misturar Fengib Plus com produtos não recomendados especificamente no rótulo, que podem alterar a actividade do produto. Deixar um intervalo de 48 horas (antes e depois) em relação à aplicação de outros produtos fitofarmacêuticos.
- A utilização indevida deste produto em culturas não recomendadas pode produzir efeitos indesejáveis.
- Não aplicar em tempo chuvoso. É necessário um intervalo mínimo de 6 horas sem chuva após a aplicação.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre. Preparar a calda na altura da aplicação.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entre-linhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



Tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

Recolher o produto derramado.

Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

Intervalo de segurança: Em citrinos aplicar até que os frutos tenham 2 cm de diâmetro e em pereira até ao final da floração; 5 dias em morangueiro.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de informação Antiveneno. Telef: 808 250 143.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de receção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



NOTAS

- Dada a grande variabilidade de comportamento das culturas, resultante da aplicação deste produto, o mesmo só deverá ser utilizado sob orientação técnica.
- Aconselha-se a realização de ensaios prévios nas variedades e condições em que o produto irá ser utilizado.
- Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na lei.



ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO

Detentor da autorização:

L. Gobbi s.r.l.

Via Vallecaldà 33 - 16013 Campo Ligure (GE) – Itália

Tel. +39 010920395 – Fax: +39 010921400

**Autorização Provisória de venda n.º 3650 concedida
pela DGAV**

Distribuidor:

SIPCAM PORTUGAL

Rua da Logística, 1 2050-542 Vila Nova da Rainha

Tlf.: 263 400 050 – Fax: 263 400 059

E-mail: sipcamportugal@sipcam.pt